

Bizonyítottan tartós és gyors hatékonyság a töréskockázat csökkentésében^(1,2,3)



EVISTA[®]

raloxifene HCl

- Az első csigolyatörés kockázata három éves kezelés után 55%-kal, a negyedik évben 50%-kal csökken
- Már egy éves kezelés után a fájdalmas csigolyatörések kockázata jelentősen (68%-kal) csökken
- Ösztrogén antagonistá hatás az emlőben és az uterusban^(4,5)
- Cardiovascularis biztonság⁽⁶⁾
- Egyszerű alkalmazhatóság, jó tolerabilitás⁽⁷⁾
 - naponta egyszer, a nap bármely időszakában
 - étkezéstől függetlenül
 - önmagában, vagy kalciummal és D vitaminnal kiegészítve szedhető



Rövidített alkalmazási előírás:

Hatóanyag: 60 mg raloxifenium chloratum. **Javallatok:** Postmenopausalis osteoporosis kezelése és megelőzése; a vertebalis fracturák csökkentése. **Adagolás:** Orálisan naponta egy tableta, a nap bármely időszakában étkezéstől függetlenül. **Ellenjavallatok:** Fogamzóképes életkor. Vénás thromboembóliás megbetegedés. Túlerzékenység. Májfunktó zavara, cholestasis. Súlyos veseelégtelenség. Rendellenes genitális vérzés. Endometrium- vagy emlőcarcinoma, mivel ezen betegségekben a raloxifen biztonságosságát nem vizsgálták kielégítő módon. **Mellékhatások:** vénás thromboembólia, hűhullámok, lábizom görcsök. **Gyógyszerkölcsönhatás:** kumarin származék egyidejű adagolása során a prothrombin idő mérsékelten csökken. A raloxifent nem szabad együtt alkalmazni cholestyramin-nal, vagy más anion cserélő gyantával. **Figyelmeztetés:** A vénás thromboembóliás megbetegedések kialakulásának veszélye hasonló mértékű a jelenleg használatos női hormonpótló kezelés során észleltéhez. Az előny/kockázat arányát kell mérlegelni a vénás thromboembóliás megbetegedések szempontjából veszélyeztetett betegek esetében. A raloxifen adását fel kell függeszteni minden olyan megbetegedés vagy állapot esetén, ami hosszan tartó immobilitációhoz vezet. A raloxifen nem okoz endometrium proliferációt, ezért raloxifen kezelés alatt jelentkező genitális vérzés esetén ennek szakorvosi kivizsgálása javasolt. A raloxifen csak postmenopausában adható, fogamzóképes korú nőknél alkalmazása kontraindikált. Terhesség során alkalmazva magzati károsodást okozhat. Szoptatás időtartama alatt használata nem javasolt, mivel befolyásolhatja a csecsemő fejlődését. Férfiak kezelésére nem javasolt. A raloxifen nem hatékony a hűhullámok vagy a menopausa ösztrogén hiánnyal összefüggő egyéb tüneteinek kezelésében.

Csomagolás: 28 filtableta.

Kérésére a teljes alkalmazási előírás elérhető: Lilly Hungária Kft. 1075 Budapest, Madách u. 13-14. Telefon: 328-5152

Irodalom: 1. Ettinger B et al. JAMA 1999;282:637-645 2. Maricic M et al. Arthritis Rheum 2000;43 [suppl 9]:S 197. 3. Eastell R et al. J Bone Miner Res 2000;15 [Suppl 1]: S229 4. Cauley JA et al. Breast Cancer Res Treat 2001;65:125-134 5. Cohen FJ et al. Obstet Gynecol 2000;95:104-110 6. Barrett-Connor E et al. JAMA 2002;287:847-857 7. Agnusdei D;Lori N: J Endocrinol Invest 1999;22:641-645

Lilly